


### **EL TEOREMA DE GAUSS-BONNET**

Alan Reyes-Figueroa Geometría Diferencial

(Aula 28) 05.May0.2021

## Motivación

¿Cuánto suman los ángulos internos en un triángulo? Respuesta: Depende de la geometría donde yace dicho triángulo.



Una primera versión del teorema fue dada por Gauss en 1848, y trata sobre triángulos geodésicos.

Afirma que el exceso sobre  $\pi$  de la suma de los ángulos internos en un triángulo geodésico T es la integral de la curvatura:

$$\sum_{j=1}^{3} \varphi_j = \pi + \iint_{\mathsf{T}} \mathsf{K} \, \mathsf{dS}.$$

P. O. Bonnet: extensión a regiones acotadas y a superficies compactas.



Recordemos que si  $\mathbf{x}: U \subseteq \mathbb{R}^2 \to S$  es una parametrización ortogonal de S (esto es F = 0), entonces la curvatura de Gauss es

$$K = -\frac{1}{2\sqrt{EG}} \left( \frac{\partial}{\partial u} \left( \frac{G_u}{\sqrt{EG}} \right) + \frac{\partial}{\partial v} \left( \frac{E_v}{\sqrt{EG}} \right) \right). \tag{1}$$

## Proposición

Sea S superficie regular en  $\mathbb{R}^3$ ,  $\mathbf{p} \in S$ . Entonces, es posible encontrar una parametrización  $\mathbf{x}: U \subseteq \mathbb{R}^2 \to S$ , definida en una vecindad U de  $\mathbf{q} = \mathbf{x}^{-1}(\mathbf{p})$  tal que F = 0 en U.  $\square$ 

De (1),  $K\sqrt{EG} = -\frac{1}{2}(\frac{\partial}{\partial u}(\frac{G_u}{\sqrt{EG}}) + \frac{\partial}{\partial v}(\frac{E_v}{\sqrt{EG}}))$ , observe que el término en el lado izquierdo  $\sqrt{EG}$  tiene una interpretación geométrica, pues

$$\int_{R} f \, dS = \int_{\mathbf{x}^{-1}(R)} (f \circ \mathbf{x}) \sqrt{EG} \, du \, dv.$$

Por otro lado, el término del lado derecho tiene una estructura similar a una divergencia  $\nabla \cdot H$ , para algún campo vectorial H en  $\mathbb{R}^2$  (pues  $\nabla \cdot H = \text{div } H = \frac{\partial}{\partial u}(H_1) + \frac{\partial}{\partial v}(H_2)$ .

#### Definición

Una región **regular**  $\Omega \subset S$  es un abierto conexo de S, con cerradura compacta en S, cuya frontera  $\partial \Omega$  es unión finita disjunta de curvas cerradas simples, cada una diferenciable por partes. Una región regular es **simple** si es homeomorfa a  $\mathbb{D}$ .



### Teorema (Teorema de la Divergencia)

Sea  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^2$  una región regular y sea  $X = (P,Q) = P \frac{\partial}{\partial u} + Q \frac{\partial}{\partial v}$  un campo vectorial sobre  $\overline{\Omega}$ . Sea  $\mathbf{n} = (v', -u')$  el vector normal unitario a la curva  $\partial \Omega = \alpha(\mathbf{s}) = (\mathbf{u}, \mathbf{v})$ . Entonces


$$\int_{\Omega}\operatorname{div}X\,du\,dv=\int_{\partial\Omega}X\cdot\mathbf{n}\,ds.\;_{\square}$$

Esto es, si  $\alpha: [a,b] \to \partial \Omega$ , con  $\alpha(s) = (u(s),v(s))$  es diferenciable en cada subintervalo de la partición  $a=t_0 < t_1 < \ldots < t_n = b$  de [a,b], entonces

$$\int_{\Omega} \left( \frac{\partial P}{\partial u} + \frac{\partial Q}{\partial v} \right) du \, dv = \sum_{i=1}^{n} \int_{t_{i-1}}^{t_{i}} \left( P(\alpha(s)) v'(s) - Q(\alpha(s)) u'(s) \right) ds.$$

#### Definición

Sean  $S \subset \mathbb{R}^3$  una superficie orientada,  $\partial \Omega = c_1 \cup \ldots \cup c_n$ . Diremos que una parametrización  $\alpha_i(s)$  de  $c_i$ ,  $i=1,2,\ldots,n$ ,  $|\alpha_i'(s)|=1$ , es **positiva** si  $\mathbf{n}_i(s)=\mathbf{N}\times\alpha_i(s)$  apunta siempre para adentro de  $\Omega$ ,  $i=1,2,\ldots,n$ . En ese caso, diremos que  $\partial \Omega$  está **positivamente orientada**.



Si S es superficie orientada,  $\mathbf{x}: U \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$  parametrización ortogonal de S, y  $R \subseteq \mathbf{x}(U)$  es una región regular simple, con  $\partial \Omega = \alpha(s)$  positivamente orientada. Aplicando el Teorema de la Divergencia a  $X = \left(\frac{G_u}{\sqrt{EG}}, \frac{E_V}{\sqrt{EG}}\right)$  y (1)

$$\int_{R} K \, dS = \int_{\mathbf{x}^{-1}(R)} K \sqrt{EG} \, du \, dv = -\frac{1}{2} \int_{\mathbf{x}^{-1}(R)} \operatorname{div} X \, du \, dv$$
$$= -\frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \int_{t_{i-1}}^{t_{i}} \left( \frac{G_{u}}{\sqrt{EG}} \, v'(s) - \frac{E_{v}}{\sqrt{EG}} \, u'(s) \right) ds.$$

- el lado derecho anterior no depende del sistema de coorenadas.
- $\int_{\mathcal{D}} K$  sólo depende del comportamiento de S en una vecindad de  $\partial R$ .

Recordemos de la clase anterior (Aula 27) que la curvatura geodésica de una curva  $\alpha$ ,  $|\alpha'|=$  1, está dada por

$$\kappa_{\mathbf{g}}\alpha(\mathbf{s}) = [\nabla_{\alpha}\alpha'(\mathbf{s})] = \langle \nabla_{\alpha}\alpha'(\mathbf{s}), \mathbf{N} \times \alpha'(\mathbf{s}) \rangle.$$

Recordemos también que si X, Y son campos tangentes unitarios, y  $\varphi$  es el ángulo entre ellos, entonces  $\varphi'(s) = [\nabla_{\alpha} Y(s)] - [\nabla_{\alpha} X(s)]$ .

En particular, si  $X(s) = \frac{\mathbf{x}_u(\alpha(s))}{\sqrt{E}}$  y  $Y(s) = \alpha'(s)$ , tenemos |X(s)| = |Y(s)| = 1, y

#### Lema

Sea S superficie orientada,  $\mathbf{x}: \mathbf{U} \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$  parametrización ortogonal de S, y  $\alpha(\mathbf{s}): \mathbf{I} \to \mathbf{x}(\mathbf{U})$  una curva con  $|\alpha'(\mathbf{s})| = \mathbf{1}$ ,  $\forall \mathbf{s} \in \mathbf{I}$ , positivamente orientada. Entonces

$$\kappa_g \alpha(s) = \frac{1}{2} \left( \frac{G_u}{\sqrt{FG}} v'(s) - \frac{E_v}{\sqrt{FG}} u'(s) \right) + \frac{d}{ds} \varphi(s).$$

#### Prueba:

Observe que

$$X'(s) = \frac{d}{ds} \left( \frac{\mathbf{x}_u}{\sqrt{E}} \right) = \left( \frac{\mathbf{x}_{uu}}{\sqrt{E}} - \frac{1}{2} \frac{E_u \mathbf{x}_u}{E^{3/2}} \right) u'(s) + \left( \frac{\mathbf{x}_{uv}}{\sqrt{E}} - \frac{1}{2} \frac{E_v \mathbf{x}_u}{E^{3/2}} \right) v'(s).$$

Como N × X =  $\frac{\mathbf{x}_v}{\sqrt{G}}$  y  $[\nabla_{\alpha} X] = \langle \nabla_{\alpha} X, N \times X \rangle = \langle \nabla_{\alpha} X, \frac{\mathbf{x}_v}{\sqrt{G}} \rangle$ , entonces

$$[\nabla_{\alpha}X] = \frac{\langle \mathbf{x}_{uu}, \mathbf{x}_{v} \rangle}{\sqrt{EG}} \, \mathbf{u}'(s) + \frac{\langle \mathbf{x}_{uv}, \mathbf{x}_{u} \rangle}{\sqrt{EG}} \, \mathbf{v}'(s).$$

De  $\langle \mathbf{x}_{uv}, \mathbf{x}_{v} \rangle = \frac{1}{2} \langle \mathbf{x}_{v}, \mathbf{x}_{v} \rangle_{u} = \frac{1}{2} G_{u} \text{ y } \langle \mathbf{x}_{uu}, \mathbf{x}_{v} \rangle = -\langle \mathbf{x}_{u}, \mathbf{x}_{uv} \rangle = -\frac{1}{2} \langle \mathbf{x}_{u}, \mathbf{x}_{u} \rangle_{v} = -\frac{1}{2} E_{v}$ , obtenemos la expresión requerida


$$\kappa_g \, \alpha(s) = \frac{1}{2} \Big( \frac{G_u}{\sqrt{EG}} \, v'(s) - \frac{E_v}{\sqrt{EG}} \, u'(s) \Big) + \frac{d}{ds} \varphi(s),$$

donde  $\varphi(s)$  es el ángulo de X(s) a  $\alpha'(s)$ .



Tomemos ahora una región  $R \subseteq \mathbf{x}(U)$  regular y simple, cuyo borde  $\partial R$  es positivamente orientado. Consideramos una parametrización  $\alpha: [a,b] \to \mathbb{R}^2$  de  $\mathbf{x}^{-1}(\partial R)$ , regular por partes en los subintervalos de  $a=t_0 < t_1 < \ldots < t_n = b$ .

Denotamos por  $\theta_j$  al ángulo  $\theta_j = \alpha'(t_j^+) - \alpha'(t_j^-)$  (ángulos externos a  $\partial R$ )



## Teorema (Índice de Rotación)

Para una curva cerrada y simple  $\alpha : [a,b] \to \mathbb{R}^2$ , regular por partes, en  $a = t_0 < t_1 < \ldots < t_n = b$ , vale

$$\sum_{j=1}^n \left(\varphi_j(t_j) - \varphi_j(t_{j-1})\right) + \sum_{j=1}^n \theta_j = \pm 2\pi.$$

Aquí,  $\varphi_j(s)$  mide el ángulo desde  $\mathbf{e}_1$  a  $\alpha'_j(s)$  (esto es, el ángulo externo a  $\alpha$  en el vértice j); y el signo depende de la orientación de  $\alpha$ .

Prueba: Basta considerar

$$\sum_{i=1}^n \left( \varphi_j(t_j) - \varphi_j(t_{j-1}) \right) + \sum_{i=1}^n \theta_j = \int_a^b \theta(s) \, ds = 2\pi \operatorname{Index}(\alpha) = \pm 2\pi. \ \Box$$

### Teorema de Gauss-Bonnet

Sea S superficie orientada,  $\mathbf{x}: U \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$  parametrización regular, uy sea  $R \subseteq \mathbf{x}(U)$  una región regular simple, cuya frontera  $\partial R$  está parametrizada por una curva  $\alpha: [a,b] \to \mathbf{x}(U)$ , regular por partes, en  $a=t_0 < t_1 < \ldots < t_n = b$ , y parametrizada por longitud de arco, con vector normal unitario a  $\partial R$ , dado por  $\mathbf{n}(s) = (v'(s), -u'(s))$ . Entonces

## Teorema (Teorema de Gauss-Bonnet local)

$$\int_{R} K dS + \sum_{j=1}^{n} \int_{t_{j-1}}^{t_j} \kappa_g \alpha(s) ds + \sum_{j=1}^{n} \theta_j = 2\pi.$$

Esto es, 
$$\int_R K dS + \int_{\partial R} \kappa_g ds + \sum_{i=12}^n \theta_i = 2\pi$$
.

### Teorema de Gauss-Bonnet

### <u>Prueba</u>: Definamos $X = (\frac{G_u}{\sqrt{FG}}, \frac{E_V}{\sqrt{FG}})$ , $\mathbf{n} = (\mathbf{v}', -\mathbf{u}')$ . Por el lema, tenemos

$$\begin{split} \sum_{j=1}^{n} \int_{t_{j-1}}^{t_{j}} \kappa_{g} \, \alpha(s) \, ds &= \sum_{j=1}^{n} \int_{t_{j-1}}^{t_{j}} \frac{1}{2} \Big( \frac{G_{u}}{\sqrt{EG}} \, \frac{dv}{ds} - \frac{E_{v}}{\sqrt{EG}} \, \frac{du}{ds} \Big) \, ds + \sum_{j=1}^{n} \int_{t_{j-1}}^{t_{j}} \frac{d}{ds} \varphi_{j}(s) \, ds \\ &= \sum_{j=1}^{n} \int_{t_{j-1}}^{t_{j}} \frac{1}{2} \Big( \frac{G_{u}}{\sqrt{EG}} \, dv - \frac{E_{v}}{\sqrt{EG}} \, du \Big) + \sum_{j=1}^{n} \varphi_{j}(s) \Big|_{t_{j-1}}^{t_{j}} \\ &= \sum_{j=1}^{n} \int_{t_{j-1}}^{t_{j}} \frac{1}{2} \, X \cdot \mathbf{n} \, ds + \sum_{j=1}^{n} \varphi_{j}(s) \Big|_{t_{j-1}}^{t_{j}} = \sum_{j=1}^{n} \int \int \frac{1}{2} \, \operatorname{div} X \, du \, dv + \sum_{j=1}^{n} \varphi_{j}(s) \Big|_{t_{j-1}}^{t_{j}} \\ &= \sum_{j=1}^{n} \int \int -K \sqrt{EG} \, du \, dv + \sum_{j=1}^{n} \left( \varphi_{j}(t_{j}) - \varphi(t_{j-1}) \right) \\ &= - \int \int_{\mathbb{R}} K \, dS - \sum_{j=1}^{n} \theta_{j} + 2\pi. \end{split}$$

### Teorema de Gauss-Bonnet

De ahí que

$$\int_{R} K \, d\mathsf{S} + \sum_{j=1}^{n} \int_{\mathsf{t}_{j-1}}^{\mathsf{t}_{j}} \kappa_{g} \, \alpha(\mathsf{s}) \, d\mathsf{s} + \sum_{j=1}^{n} \theta_{j} = \mathsf{2}\pi. \, \square$$

#### Obs!

- El Teorema de Gauss-Bonnet local, sobre una región regular R, combina información geométrica de diferentes naturalezas: la curvatura gaussiana en R, la curvatura geodésica en  $\partial R$ , más información de los ángulos externos.
- Existe una versión global de Teorema de Gauss-Bonnet sobre una superficies compacta S. Esta combina además, información topológica de S.

Mencionamos ahora varios conceptos topológicos que serán de utilidad.



#### Definición


El **simplex estándar** o n**-simplex**  $\Delta^n$  , es el subconjunto de  $\mathbb{R}^{n+1}$  definido por


$$\Delta^n = \{(t_0, \ldots, t_n) \in \mathbb{R}^{n+1} : \sum_{i=0}^n t_i = 1 \ y \ t_i \geq 0, \ \forall i\}.$$



2-simplex  $\Delta^2 \subset \mathbb{R}^3$ .







0

Simplejos estándar  $\Delta^n$ , para n = 0, 1, 2, 3.

• Los vértices del *n*-simplex estándar son lo puntos  $\mathbf{e}_0, \mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n \in \mathbb{R}^{n+1}$ .

$$\mathbf{e}_{0} = (1, 0, 0, \dots, 0), \ \mathbf{e}_{1} = (0, 1, 0, \dots, 0), \dots, \ \mathbf{e}_{n} = (0, 0, 0, \dots, 1).$$

- Denotamos al *n*-simplex  $\Delta^n$  por  $[\mathbf{e}_0, \mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n]$ .
- Un conjunto de puntos  $\mathbf{v}_0, \mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n \in \mathbb{R}^{n+1}$  (con  $\mathbf{v}_1 \mathbf{v}_0, \mathbf{v}_2 \mathbf{v}_0, \dots, \mathbf{v}_n \mathbf{v}_0$  l.i.), define un n-simplex arbitrario  $\sigma = [\mathbf{v}_0, \mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n] \subset \mathbb{R}^{n+1}$  por mediante el mapa

$$\sigma = [\mathbf{v}_0, \mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n] = \{\mathbf{x} = \sum_{i=0}^n t_i \mathbf{v}_i \in \mathbb{R}^{n+1} : \sum_{i=0}^n t_i = 1 \text{ y } t_i \geq 0, \ \forall i\}.$$

• Hay un homeomorfismo natural de  $\Delta^n$  a  $[\mathbf{v}_0,\mathbf{v}_1,\ldots,\mathbf{v}_n]$ , dado por

$$\sum_{i=1}^{m} t_i \mathbf{e}_i \longrightarrow \sum_{i=1}^{m} t_i \mathbf{v}_i$$
.

### Definición

Sea  $\sigma = [\mathbf{v}_0, \mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n]$  un n-simplex en  $\mathbb{R}^p$ .

Cualquier m-simplex,  $0 \le m < n$ , formado de los vértices de  $\sigma$ , es llamado una m-cara de  $\sigma$ . En particular, los 0-caras son los **vértices** de  $\sigma$ ; las 1-caras son las **aristas** de  $\sigma$ ; y las (n-1)-caras son las **caras** (faces) de  $\sigma$ .

En particular, la i-ésima cara de  $\sigma$  es  $\sigma_i = [\mathbf{v}_0, \dots, \mathbf{v}_{i-1}, \mathbf{v}_{i+1}, \dots, \mathbf{v}_n]$ .


#### Definición

Decimos que un n-simplex  $\sigma = [\mathbf{v}_0, \mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n]$  tiene una **orientación positiva** si det $[\mathbf{v}_0, \mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n] > 0$ . El **borde** (con signo) de  $\sigma$  se define como


$$\partial \sigma = \sum_{i=0}^{n} (-1)^i \sigma_i = \sum_{i=0}^{n} (-1)^i [\mathbf{v}_0, \dots, \mathbf{v}_{i-1}, \mathbf{v}_{i+1}, \dots, \mathbf{v}_n].$$

$$v_0 \xrightarrow{+} v_1$$

$$\partial[v_0, v_1] = [v_1] - [v_0]$$



$$\partial [v_0,v_1,v_2] = [v_1,v_2] - [v_0,v_2] + [v_0,v_1]$$




$$\begin{split} \partial [v_0, v_1, v_2, v_3] &= [v_1, v_2, v_3] - [v_0, v_2, v_3] \\ &+ [v_0, v_1, v_3] - [v_0, v_1, v_2] \end{split}$$

# Complejos Simpliciales

#### Definición

Un **complejo simplicial** es un conjunto finito de simplejos K de  $\mathbb{R}^n$ , que cumple las dos condiciones siguientes:

- Si un n-simplex  $\sigma$  pertenece a  $\mathcal K$  entonces todas sus m-caras pertenecen a  $\mathcal K$ , para  $0 \le m \le n$ .
- Si dos simplejos  $\sigma, \tau$  de K se cortan, entonces su intersección  $\sigma \cap \tau$  es una cara común.




# Complejos Simpliciales

#### Definición

La **dimensión** de un n-simplex  $\sigma$  es dim  $\sigma = n$ . La dimensión de un complejo simplicial K se define por

$$\dim \mathcal{K} = \max\{\dim \sigma : \sigma \in \mathcal{K}, \ \sigma \ \textit{es simplex}\}.$$

Los complejos simpliciales pueden ser estructuras muy complicadas. Nos interesa aquí sólo los complejos de dimension  $\leq$  2.



**Obs!** Si  $S \subseteq \mathbb{R}^3$  es una superficie, nos interesan las imágenes de complejos simpliciales en  $U \subseteq \mathbb{R}^2$ , bajo la parametrización  $\mathbf{x} : U \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ .

# Triangulaciones

#### Definición

Una **triangulación** de un espacio topológico X es un complejo simplicial  $\mathcal{K}$  homeomorfo a X, junto con un homeomorfismo  $h: \mathcal{K} \to X$ .


**Obs!** Típicamente, los elementos de esta triangulación son simplejos de la misma dimension dim X.

En el caso de superficies


#### Definición

Una región regular simple R sobre una superficie  $S \subset \mathbb{R}^3$  es un **triángulo** si  $\partial R$  posee tres vértices (esto es, si R es la imagen parametrizada de un 2-simplex). En ese caso, una triangulación de R es un complejo simplicial  $\mathcal K$  formado por una colección (finita) de triángulos y sus caras, de forma que  $\mathcal K$  es homeomorfo a R.

# Triangulaciones



Ejemplos de triangulaciones para algunas superficies.



Triangulaciones para una región regular R.

