

Medidas:

Ej: medida de Lebesgue $|A|_e = \inf \left\{ \sum_k |I_k| : \{I_k\} \text{ es colertura de } A \right\}$

luego $|A|=|A|_e$ si $\forall \varepsilon \exists G$ abierto con $A \subseteq G$ y

$$|G-A|_e = 0.$$



- $|A| \geq 0$
- $A \subseteq B \Rightarrow |A| \leq |B|$
- $\left| \bigcup_{n \geq 1} A_n \right| \leq \sum_{n \geq 1} |A_n| \quad \text{y} \quad \left| \bigcup_{n \geq 1} A_n \right| = \sum_{n \geq 1} |A_n|.$

Def: Sea X un conjunto y \mathcal{A} una σ -álgebra sobre X . Una medida

(positiva) es una función $\mu: \mathcal{A} \rightarrow [0, \infty]$, y que satisface

- i) $\mu(\emptyset) = 0.$
- ii) $\{A_n\}_{n \geq 1} \subseteq \mathcal{A}$, disjuntos a pares

entonces $\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n)$. (σ -aditiva).

Obs! • si valen (i) y (ii) pero \mathcal{A} no es σ -álgebra, entonces μ se llama una pre-medida.

- (ii) se requiere que $\bigcup_{n \geq 1} A_n \in \mathcal{A}$ (claramente si \mathcal{A} es σ -álgebra esto vale). En el caso de pre-medidas, requiere más cuidado.

Antes de calcular $\mu(B)$, asegurarse que $B \in \mathcal{A}$.

Notación: $A_n \nearrow A$ significa $A_1 \subseteq A_2 \subseteq A_3 \subseteq \dots$ y $A = \bigcup_{n \geq 1} A_n = \lim_n A_n$

$B_n \searrow B$ significa $B_1 \supseteq B_2 \supseteq B_3 \supseteq \dots$ y $B = \bigcap_{n \geq 1} B_n = \lim_n B_n$.

Def: Sea X conjunto y \mathcal{A} una σ -álgebra en X . El par (X, \mathcal{A}) se llama un espacio measurable (medible).

Si μ es una medida en X , la estructura (X, \mathcal{A}, μ) se llama un espacio de medida.

Una medida finita es aquella donde $\mu(X) < \infty$ (a veces se llama también medida compacta).

Una medida de probabilidad es aquella donde $\mu(X) = 1$.

En ese caso (X, \mathcal{A}, μ) se llama un espacio de probabilidad (Obs! usamos P en lugar de μ).

Def: Una medida μ es σ -finita si \mathcal{F} contiene una secuencia $\{A_n\}_{n \geq 1}$ tal que $A_n \nearrow X$ y $\mu(A_n) < \infty$, $\forall n \in \mathbb{N}$.

Propiedades: (Propiedades básicas de medidas). Sea (X, \mathcal{F}, μ) un espacio de medida, $A, B, A_n, B_n \in \mathcal{F}$, th.

- 1) (aditividad) $A \cap B = \emptyset \Rightarrow \mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B).$
- 2) (monotonía) $A \subseteq B \Rightarrow \mu(A) \leq \mu(B)$
- 3) (diferencia) Si $A \subseteq B$ y $\mu(B) < \infty \Rightarrow \mu(B - A) = \mu(B) - \mu(A).$
- 4) (principio inclusión-exclusión) $\mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B) - \mu(A \cap B).$
- 5) (sub-aditividad) $\mu\left(\bigcup_{k=1}^n A_k\right) \leq \sum_{k=1}^n \mu(A_k).$

6) (continuidad inferior)

$$\text{Si } A_n \nearrow A \Rightarrow \mu(A) = \sup_{n \geq 1} \mu(A_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n)$$

7) (continuidad superior)

$$\text{Si } B_n \searrow B \Rightarrow \mu(B) = \inf_{\substack{n \geq 1 \\ y \mu(B_n) < \infty}} \mu(B_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(B_n)$$

$$\mu(\lim_n A_n) = \lim_n \mu(A_n)$$

$$A_n \nearrow$$

" μ continua"

$$\mu(\lim_n B_n) = \lim_n \mu(B_n)$$

$$B_n \searrow$$

8) (σ -subaditividad)

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n).$$

Prueba: (1) Hacemos $A_1 = A$, $A_2 = B$, $A_3 = A_4 = \dots = \emptyset$. Entonces $\{A_n\} \in \mathcal{A}$ y los A_n son disjuntos a pares

$$\mu(A \cup B) = \mu\left(\bigcup_{n \geq 1} A_n\right) = \sum_{n \geq 1} \mu(A_n) = \mu(A) + \mu(B).$$

(2) $A \subseteq B \Rightarrow B = A \cup (B - A)$ 互いに disjointa

$$\Rightarrow \mu(B) = \mu(A) + \underbrace{\mu(B - A)}_{\geq 0} \geq \mu(A).$$

(3) De (2). como $\mu(B) < \infty$ y $A \subseteq B \Rightarrow \mu(A) < \infty$ y la restamos en ambos lados

$$\mu(B) - \mu(A) = \mu(B - A).$$

(4) Para todos $A, B \in \mathcal{A}$ ~~$(A \cup B) - (A \cap B) = A \cup [B - (A \cap B)]$~~



Escribimos $A \cup B = [A - (A \cap B)] \cup [B - (A \cap B)] \cup (A \cap B)$


$$\begin{aligned}\Rightarrow \mu(A \cup B) &= \mu(A - (A \cap B)) + \mu(B - (A \cap B)) + \mu(A \cap B) \\ &= \mu(A) - \mu(\cancel{A \cap B}) + \mu(B) - \mu(\cancel{A \cap B}) + \mu(\cancel{A \cap B}) \\ &= \mu(A) + \mu(B) - \mu(A \cap B).\end{aligned}$$

(5) De (4): $\mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B) - \underbrace{\mu(A \cap B)}_{\geq 0} \leq \mu(A) + \mu(B).$

Por inducción: $\mu\left(\bigcup_{k=1}^n A_k\right) \leq \sum_{k=1}^n \mu(A_k).$

(6) Tomemos $F_1 = A_1, F_2 = A_2 - A_1, F_3 = A_3 - A_2, \dots, F_n = A_n - A_{n-1}.$

Los F_n están y



los F_n son disjuntos
a pares

$$y. \quad \bigcup_{n \geq 1} F_n = \bigcup_{n \geq 1} A_n \quad y. \quad \bigcup_{n=1}^k F_n = \bigcup_{n=1}^m A_n, \forall k \quad A_n \nearrow A$$

$$\begin{aligned} \underline{\mu}(A) &= \mu\left(\bigcup_{n \geq 1} A_n\right) = \mu\left(\bigcup_{n \geq 1} F_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(F_n) = \lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^k \mu(F_n) \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} \mu\left(\bigcup_{n=1}^k F_n\right) = \lim_{k \rightarrow \infty} \mu\left(\bigcup_{n=1}^k A_n\right) = \lim_{k \rightarrow \infty} \underline{\mu}(A_k) \end{aligned}$$

$$\mu\left(\lim_{k \rightarrow \infty} A_k\right) = \lim_{k \rightarrow \infty} \underline{\mu}(A_k).$$

$$(7) \quad B_n \searrow B \quad y. \quad \mu(B_1) < \infty. \Rightarrow B_1 - B_n \nearrow B_1 - B. \quad \text{De (6)}$$

$$\begin{aligned} \cancel{\mu(B_1)} - \mu(B) &= \mu(B_1 - B) = \mu\left(\lim_{n \rightarrow \infty} (B_1 - B_n)\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(B_1 - B_n) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} [\mu(B_1) - \mu(B_n)] = \cancel{\mu(B_1)} - \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(B_n) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \mu\left(\lim_{n \rightarrow \infty} B_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(B_n).$$

(8) Usamos la sub-additividad.

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \mu\left(\lim_{k \rightarrow \infty} \bigcup_{n=1}^k A_n\right) = \lim_{k \rightarrow \infty} \mu\left(\bigcup_{n=1}^k A_n\right)$$

$$\leq \lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^k \mu(A_n)$$

$$\leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n).$$

□

$$|\mu\left(\bigcup A_n\right) \leq \sum \mu(A_n)$$