

## **FRACCIONES CONTINUAS II**

ALAN REYES-FIGUEROA  
TEORÍA DE NÚMEROS

(AULA 26) 07.OCTUBRE.2024

# Fracciones Continuas

## Proposición

Vale

$$x - \frac{p_n}{q_n} = \frac{(-1)^n}{(\alpha_{n+1} + \beta_{n+1}) q_n^2},$$

donde  $\beta_{n+1} = \frac{q_{n-1}}{q_n} = [0; a_n, a_{n-1}, a_{n-2}, \dots, a_1]$ . En particular

$$\frac{1}{(a_{n+1} + 2) q_n^2} < \left| x - \frac{p_n}{q_n} \right| = \frac{1}{(\alpha_{n+1} + \beta_{n+1}) q_n^2} < \frac{1}{a_{n+1} q_n^2}.$$

**Obs!**

- Como  $\lim_{n \rightarrow \infty} q_n = +\infty$ , ya que la secuencia es estrictamente creciente, entonces podemos recuperar  $x$  como el límite

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{p_n}{q_n},$$

lo que da sentido a la expresión  $x = [a_0; a_1, a_2, \dots]$ .

# Fracciones Continuas

- La proposición anterior implica que para todo  $\alpha$  irracional, la desigualdad  $|\alpha - \frac{p}{q}| < \frac{1}{q^2}$  posee infinitas soluciones racionales. Esto se conoce como el Teorema de Dirichlet.
- Si  $\alpha = \frac{r}{s} \in \mathbb{Q}$  es racional, la desigualdad  $|\alpha - \frac{p}{q}| < \frac{1}{q^2}$  sólo tiene un número finito de soluciones racionales  $\frac{p}{q}$ .

De hecho, en este caso

$$|\frac{r}{s} - \frac{p}{q}| < \frac{1}{q^2} \implies |rq - ps| < \frac{s}{q} \implies q \leq s.$$

(Esto es porque  $q \leq q \underbrace{|rq - ps|}_{\leq 1} < s$ ).

La siguiente proposición muestra que los convergentes pares de una fracción continua forman una secuencia creciente, mientras que los convergentes impares forman una secuencia decreciente. Además, los convergentes impares son siempre mayores que los pares.

# Fracciones Continuas

## Proposición

Para todo  $k \geq 0$ , vale

$$\frac{p_{2k}}{q_{2k}} \leq \frac{p_{2k+2}}{q_{2k+2}} \leq x \leq \frac{p_{2k+3}}{q_{2k+3}} \leq \frac{p_{2k+1}}{q_{2k+1}}.$$

**Prueba:** El resultado de sigue de los siguientes hechos generales. Para todo  $n \geq 0$  tenemos

$$\frac{p_{2n+2}}{q_{2n+2}} - \frac{p_{2n}}{q_{2n}} = \frac{a_{2n+2}p_{2n+1} + p_{2n}}{a_{2n+2}q_{2n+1} + q_{2n}} - \frac{p_{2n}}{q_{2n}} = \frac{a_{2n+2}(p_{2n+1}q_{2n} - p_{2n}q_{2n+1})}{(a_{2n+2}q_{2n+1} + q_{2n})q_{2n}} = \frac{(-1)^{2n} a_{2n+2}}{q_{2n+2}q_{2n}} > 0.$$

Similarmenete

$$\frac{p_{2n+3}}{q_{2n+3}} - \frac{p_{2n+1}}{q_{2n+1}} = \frac{a_{2n+3}p_{2n+2} + p_{2n+1}}{a_{2n+3}q_{2n+2} + q_{2n+1}} - \frac{p_{2n+1}}{q_{2n+1}} = \frac{a_{2n+3}(p_{2n+2}q_{2n+1} - p_{2n+1}q_{2n+2})}{(a_{2n+3}q_{2n+2} + q_{2n+1})q_{2n+1}} = \frac{(-1)^{2n+1} a_{2n+3}}{q_{2n+3}q_{2n+1}} < 0.$$

Por otro lado, para todo  $n \geq 0$ , se tiene que  $x - \frac{p_n}{q_n} = \frac{(-1)^n}{(\alpha_{n+1} + \beta_{n+1})q_n^2}$ ,

y este término es positivo para  $n$  par ( $\Rightarrow$  las convergentes pares son menores a  $x$ ), y es negativo cuando  $n$  es impar ( $\Rightarrow$  las convergentes impares son mayores a  $x$ ).  $\square$

# Fracciones Continuas

## Proposición

Sean  $a_0, a_1, \dots, a_n \in \mathbb{Z}$ , con  $a_k > 0$  para  $k \geq 1$ , y sea  $\{\frac{p_n}{q_n}\}$  la secuencia de convergentes de la fracción continua  $x = [a_0; a_1, a_2, \dots, a_n]$ . Entonces, el conjunto de los números reales cuya representación por fracciones continuas comienza con  $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n$  es el intervalo

$$I(a_0; a_1, a_2, \dots, a_n) = \left\{ \frac{p_n}{q_n} \right\} \cup \{ [a_0; a_1, a_2, \dots, a_n, \alpha] : \alpha > 1 \} = \begin{cases} \left[ \frac{p_n}{q_n}, \frac{p_n + p_{n-1}}{q_n + q_{n-1}} \right), & n \text{ par;} \\ \left( \frac{p_n + p_{n-1}}{q_n + q_{n-1}}, \frac{p_n}{q_n} \right] & n \text{ impar.} \end{cases}$$

Además, la función  $G : [1, \infty) \rightarrow I(a_0; a_1, \dots, a_n)$ , dada por  $G(\alpha) = [a_0; a_1, a_2, \dots, a_n, \alpha]$  es monótona, siendo creciente para  $n$  impar y decreciente para  $n$  par.

Prueba: Basta notar que, de los corolarios de la clase anterior, se tiene

$$G(\alpha) = [a_0; a_1, a_2, \dots, a_n, \alpha] = \frac{\alpha p_n + p_{n-1}}{\alpha q_n + q_{n-1}} = \frac{p_n}{q_n} + \frac{(-1)^n}{(\alpha q_n + q_{n-1}) q_n}.$$

# Fracciones Continuas

Esta es una función monótona en  $\alpha$  (creciente para  $n$  impar, y es decreciente para  $n$  par).

Luego, para  $I = [1, \infty)$ , tenemos que  $G(I)$  es un intervalo (pues  $G$  es continua, e  $I$  es conexo  $\Rightarrow G(I)$  es conexo  $\Rightarrow G(I)$  es un intervalo en  $\mathbb{R}$ . En particular  $G[1, \infty) = [G(1), G(\infty))$ .

Como  $G(1) = \frac{p_n + p_{n-1}}{q_n + q_{n-1}}$  y  $\lim_{\alpha \rightarrow \infty} G(\alpha) = \frac{p_n}{q_n}$ , entonces

$$G([1, \infty)) = \begin{cases} (\frac{p_n}{q_n}, \frac{p_n + p_{n-1}}{q_n + q_{n-1}}), & n \text{ par;} \\ (\frac{p_n + p_{n-1}}{q_n + q_{n-1}}, \frac{p_n}{q_n}) & n \text{ impar.} \end{cases}$$

De ahí que

$$\begin{aligned} I(a_0; a_1, a_2, \dots, a_n) &= \left\{ \frac{p_n}{q_n} \right\} \cup \{[a_0; a_1, a_2, \dots, a_n, \alpha] : \alpha > 1\} = \left\{ \frac{p_n}{q_n} \right\} \cup G([1, \infty)) \\ &= \begin{cases} [\frac{p_n}{q_n}, \frac{p_n + p_{n-1}}{q_n + q_{n-1}}), & n \text{ par;} \\ (\frac{p_n + p_{n-1}}{q_n + q_{n-1}}, \frac{p_n}{q_n}] & n \text{ impar.} \end{cases} \quad \square \end{aligned}$$

# Fracciones Continuas

## Proposición

Dados enteros  $a_0, a_1, a_2, \dots$  con  $a_k > 0$  para  $k \geq 1$ , existe un único número irracional  $\alpha$ , cuya representación en fracciones continuas es  $[a_0; a_1, a_2, \dots]$ .

Prueba: Considere las secuencias  $\{p_n\}$  y  $\{q_n\}$  definidas por las recurrencias

$$p_{n+2} = a_{n+2}p_{n+1} + p_n, \quad q_{n+2} = a_{n+2}q_{n+1} + q_n, \quad \text{para } n \geq 0,$$

con  $p_0 = a_0, p_1 = a_0a_1 + 1, q_0 = 1, q_1 = a_1$ .

De la propiedad

$$\frac{p_{2k}}{q_{2k}} \leq \frac{p_{2k+2}}{q_{2k+2}} \leq \dots \leq \frac{p_{2k+3}}{q_{2k+3}} \leq \frac{p_{2k+1}}{q_{2k+1}}, \quad k \geq 0,$$

consideramos los intervalos cerrados

$$I_k = \left[ \frac{p_{2k}}{q_{2k}}, \frac{p_{2k+1}}{q_{2k+1}} \right].$$

En particular,  $I_0 \subset I_1 \subset I_2 \subset \dots$ , de modo que los  $I_k$  forman una secuencia anidada de intervalos cerrados.

# Fracciones Continuas

Por el Teorema de Intersección de Cantor, tal secuencia tiene intersección no vacía (de hecho la intersección es un intervalo cerrado). Además, como

$$|I_k| = \frac{p_{2k+1}}{q_{2k+1}} - \frac{p_{2k}}{q_{2k}} = \frac{p_{2k+1}q_{2k} - p_{2k}q_{2k+1}}{q_{2k+1}q_{2k}} = \frac{(-1)^{2k}}{q_{2k+1}q_{2k}} = \frac{1}{q_{2k+1}q_{2k}},$$

entonces  $\lim_{k \rightarrow \infty} |I_k| = 0$ . Así, existe  $\alpha \in \mathbb{R}$  tal que

$$\bigcap_{k \geq 0} I_k = \{\alpha\}.$$

Como  $[a_0; a_1, \dots, a_{2k}] = \frac{p_{2k}}{q_{2k}} \leq \alpha \leq \frac{p_{2k+1}}{q_{2k+1}} = [a_0; a_1, \dots, a_{2k+1}]$ ,  $\forall k \geq 0$ .

De la proposición anterior,  $[a_0; a_1, \dots, a_{2k}]$  y  $[a_0; a_1, \dots, a_{2k+1}]$  pertenecen al intervalo  $I(a_0; a_1, \dots, a_{2k})$ . Portanto  $\alpha \in I(a_0; a_1, \dots, a_{2k})$ , de modo que la fracción continua de  $\alpha$ , comienza con  $[a_0; a_1, \dots, a_{2k}]$ ,  $\forall k \geq 0$ .

Esto muestra que  $\alpha = [a_0; a_1, a_2, \dots]$ .  $\square$

# Ejemplos

## Ejemplos:

- $\pi = [3; 7, 15, 1, 292, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 14, 2, 1, \dots]$

Portanto

$$\frac{p_0}{q_0} = 3, \quad \frac{p_1}{q_1} = \frac{22}{7}, \quad \frac{p_2}{q_2} = \frac{333}{106}, \quad \frac{p_3}{q_3} = \frac{355}{113}, \dots$$

- $e = [2; 1, 2, 1, 1, 4, 1, 1, 6, 1, 1, 8, \dots, 1, 1, 2m, \dots]$ .

- $\sqrt{2} = [1; 2, 2, 2, 2, 2, \dots]$ .

- $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2} = [1; 1, 1, 1, 1, \dots]$ .

# Buenas Aproximaciones

## Teorema

Para todo  $n \in \mathbb{N}$

$$\left| x - \frac{p_n}{q_n} \right| \leq \frac{1}{q_n q_{n+1}} < \frac{1}{q_n^2}.$$

Además,

$$\left| x - \frac{p_n}{q_n} \right| < \frac{1}{2q_n^2} \quad \text{ó} \quad \left| x - \frac{p_{n+1}}{q_{n+1}} \right| < \frac{1}{2q_{n+1}^2}.$$

Prueba:  $x$  siempre pertenece al intervalo con extremos  $\frac{p_n}{q_n}$  y  $\frac{p_{n+1}}{q_{n+1}}$ , cuya longitud es

$$\left| \frac{p_{n+1}}{q_{n+1}} - \frac{p_n}{q_n} \right| = \left| \frac{p_{n+1}q_n - p_n q_{n+1}}{q_{n+1}q_n} \right| = \left| \frac{(-1)^n}{q_{n+1}q_n} \right| \implies \left| x - \frac{p_n}{q_n} \right| \leq \frac{1}{q_{n+1}q_n} < \frac{1}{q_n^2}.$$

Además, si  $\left| x - \frac{p_n}{q_n} \right| \geq \frac{1}{2q_n^2}$  y  $\left| x - \frac{p_{n+1}}{q_{n+1}} \right| \geq \frac{1}{2q_{n+1}^2}$ , entonces

$$\frac{1}{q_n q_{n+1}} = \left| x - \frac{p_n}{q_n} \right| + \left| x - \frac{p_{n+1}}{q_{n+1}} \right| \geq \frac{1}{2q_n^2} + \frac{1}{2q_{n+1}^2} \implies 1 \geq \frac{1}{2} \left( \frac{q_{n+1}}{q_n} + \frac{q_n}{q_{n+1}} \right)$$

Pero de AM-GM, ésta última es  $1 \geq \frac{1}{2} \left( \frac{q_{n+1}}{q_n} + \frac{q_n}{q_{n+1}} \right) \geq \sqrt{\frac{q_{n+1}q_n}{q_{n+1}q_n}} = 1 \implies q_n = q_{n+1}$ , absurdo.  $\square$

# Buenas Aproximaciones

**Observación:** Note que

$$\left| x - \frac{p_n}{q_n} \right| \leq \frac{1}{q_n q_{n+1}} < \frac{1}{a_{n+1} q_n^2}.$$

De esto se desprende que cuando mayor es  $a_{n+1}$ , mejor será la aproximación  $\frac{p_n}{q_n}$  de  $x$ .

**Ejemplo:** De  $\pi = [3; 7, 15, 1, 292, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 14, 2, 1, \dots]$  podemos observar que  $a_4 = 292$  implica que

$$\frac{p_3}{q_3} = \frac{355}{113} \approx 3.1415929204 \dots$$

es una buena aproximación de  $\pi$ .

## Corolario (Teorema de Dirichlet)

Para todo  $x \notin \mathbb{Q}$  irracional, la ecuación  $\left| x - \frac{p}{q} \right| < \frac{1}{q^2}$  posee infinitas soluciones racionales  $\frac{p}{q}$ .  $\square$

# Buenas Aproximaciones

## Teorema (Hurwitz-Markov)

Para todo  $\alpha \notin \mathbb{Q}$  irracional y todo entero  $n \geq 1$ , tenemos

$$\left| \alpha - \frac{p}{q} \right| < \frac{1}{\sqrt{5}q^2}$$

para al menos un racional

$$\frac{p}{q} \in \left\{ \frac{p_{n-1}}{q_{n-1}}, \frac{p_n}{q_n}, \frac{p_{n+1}}{q_{n+1}} \right\}.$$

En particular, la desigualdad arriba tiene infinitas soluciones racionales  $\frac{p}{q}$ .

Prueba: Suponga que el resultado es falso. De la proposición de la clase anterior

$$x - \frac{p_n}{q_n} = \frac{(-1)^n}{(\alpha_{n+1} + \beta_{n+1})q_n^2},$$

entonces existe  $\alpha$  irracional tal que  $\alpha_n + \beta_n \leq \sqrt{5}$ ,  $\alpha_{n+1} + \beta_{n+1} \leq \sqrt{5}$  y  $\alpha_{n+2} + \beta_{n+2} \leq \sqrt{5}$ .

# Buenas Aproximaciones

De  $\alpha_n + \beta_n \leq \sqrt{5}$ ,  $\alpha_{n+1} + \beta_{n+1} \leq \sqrt{5}$  y  $\alpha_{n+2} + \beta_{n+2} \leq \sqrt{5}$ , se deduce que

$$a_n = \lfloor \alpha_n \rfloor \leq 2, \quad a_{n+1} = \lfloor \alpha_{n+1} \rfloor \leq 2, \quad a_{n+2} = \lfloor \alpha_{n+2} \rfloor \leq 2.$$

Si algún  $a_k$ , con  $k \in \{n+1, n+2\}$  fuese exactamente 2, tendríamos

$\alpha_k + \beta_k \geq 2 + \frac{1}{3} > \sqrt{5}$ , un absurdo.

(recordar que  $\beta_k = [0, a_{k-1}, \dots, a_1]$  implica que  $\beta_k \geq \frac{1}{a_n} \geq \frac{1}{2} > \frac{1}{3}$ ). De ahí que

$$a_{n+1} = a_{n+2} = 1.$$

Sean  $x = \frac{1}{\alpha_{n+2}}$ ,  $y = \beta_{n+1}$ . Las desigualdades arriba se traducen en

$$\frac{1}{1+x} + \frac{1}{y} \leq \sqrt{5}, \quad 1+x+y \leq \sqrt{5}, \quad \frac{1}{x} + \frac{1}{1+y} \leq \sqrt{5}.$$

Tenemos

$$\begin{aligned} 1+x+y \leq \sqrt{5} &\implies 1+x \leq \sqrt{5}-y &\implies \frac{1}{1+x} + \frac{1}{y} &\geq \frac{1}{\sqrt{5}-y} + \frac{1}{y} = \frac{\sqrt{5}}{y(\sqrt{5}-y)} \\ &\implies y(\sqrt{5}-y) \geq 1 &\implies y &\geq \frac{\sqrt{5}-1}{2}. \end{aligned}$$

# Fracciones Continuas

$$\begin{aligned}1 + x + y \leq \sqrt{5} &\implies x \leq \sqrt{5} - y - 1 \\ &\implies \frac{1}{x} + \frac{1}{1+y} \geq \frac{1}{\sqrt{5} - y - 1} + \frac{1}{1+y} = \frac{\sqrt{5}}{(1+y)(\sqrt{5} - y) - 1} \\ &\implies (1+y)(\sqrt{5} - y - 1) \geq 1 \implies y \leq \frac{\sqrt{5} - 1}{2}.\end{aligned}$$

Portanto, debemos tener  $y = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$ , pero esto es un absurdo, pues  $y = \beta_{n+1} = \frac{q_{n-1}}{q_n} \in \mathbb{Q}$ .  $\square$

**Obs!** Acabamos de mostrar en particular que la ecuación  $|\alpha - \frac{p}{q}| < \frac{1}{\sqrt{5}q^2}$  posee infinitas soluciones racionales  $\frac{p}{q}$ , para todo número irracional  $\alpha$ .

El número  $\sqrt{5}$  es el mayor con esta propiedad. De hecho, para todo  $\varepsilon > 0$ , la ecuación

$$\left| \alpha - \frac{p}{q} \right| < \frac{1}{(\sqrt{5} + \varepsilon) q^2}$$

sólo posee un número finito de soluciones racionales  $\frac{p}{q} \in \mathbb{Q}$ .